

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению вакцины Галлимун 201 IBD+REO  
против инфекционного бурсита и  
реовирусного артрита птиц инактивированной  
(организация-производитель " Merial"/ «Мериал» Италия).

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Вакцина Галлимун 201 IBD+REO (Gallimune 201 IBD+REO) инактивированная.
2. Вакцина Галлимун 201 IBD+REO против инфекционного бурсита и реовирусного артрита птиц инактивированная изготовлена из инактивированного вируса штамма «VNJO» инфекционной бурсальной болезни (ИББ, болезни Гамборо) и инактивированного вируса реовирусного артрита птиц (РЕО), с добавлением консерванта и масляного адьюванта.
3. Вакцина представляет собой гомогенную эмульсию белого цвета. Допускается частичное расслоение эмульсии, легко восстанавливаемое при встряхивании.
4. Вакцину расфасовывают в стерильные пластиковые флаконы вместимостью 300 см<sup>3</sup> с содержанием 1000 доз. Флаконы должны быть укупорены резиновыми пробками и обкатаны металлическими колпачками.
5. На флакон с вакциной наклеивают этикетку с указанием: фирмы-изготовителя и ее товарного знака, наименования вакцины и ее объема во флаконе (см<sup>3</sup>), количества прививных доз, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения.
6. Срок годности вакцины составляет 24 месяца при условии хранения в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре (2-8)<sup>0</sup>С, не допуская замораживания. Нельзя применять вакцину после истечения срока годности.
7. Флаконы без этикеток, с нарушенной укупоркой, измененным цветом и консистенцией вакцины или содержащие постороннюю примесь, а также подвергшиеся замораживанию, выбраковывают.

**II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАКЦИНЫ**

8. Птица приобретает иммунитет против возбудителей ИББ и РЕО через 2-4 недели после вакцинации. Иммунитет сохраняется в течение всего продуктивного периода и передается потомству посредством желточных антител.
9. Вакцина в рекомендованных дозах ареактогенна и безвредна.

**III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ**

10. Вакцину «Галлимун 201 IBD+REO» применяют в племенных и товарных хозяйствах для защиты поголовья от инфекционной бурсальной болезни и реовирусного артрита птиц. Вакцина «Галлимун 201 IBD+REO» используется для иммунизации родительского стада. Цыплят вакцинируют соответствующими живыми вакцинами.

11.Прививке подлежит клинически здоровая птица за 2-4 недели до начала продуктивного периода. Если используют более одного продуктивного периода, то после линьки следует провести ревакцинацию.

12. Перед использованием содержимое флаконов с вакциной подогревают до комнатной температуры и перемешивают энергичным встряхиванием. Вакцину вводят однократно подкожно в область нижней трети шеи или внутримышечно в область грудной или бедренной группы мышц в объеме 0,3 см<sup>3</sup>.

13. Шприцы и иглы перед вакцинацией стерилизуют кипячением, место введения дезинфицируют.

Вакцина не вызывает клинически выраженной реакции. На месте инъекции в некоторых случаях возможно образование легкой припухлости, исчезающей через 2-3 недели.

14. Остатки препарата и флаконы из-под использованной вакцины обеззараживают кипячением в течение 15 минут.

15. Мясо птицы используют без ограничения через 20 суток после вакцинации.

Тушки птицы, убитой ранее этого срока подлежат тщательной ветеринарно-санитарной экспертизе и, при обнаружении на месте введения вакцины признаков воспаления или не рассосавшегося адьюванта, подлежат выбраковке.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

16. При работе с вакциной следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

17. При случайном попадании вакцины на кожу смыть струей воды с мылом.

Инструкция разработана фирмой «Мериал» Франция  
Организация-производитель фирма «Мериал» Италия

Merial Italia s.p.a., 35027 Noventa Padovana (PD),  
Via Baviera, 9, Italy  
35027 Италия Новента Падуя, Бавиера 9