

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению вакцины Гумбориффа  
против болезни Гамборо птиц инактивированной  
(организация-производитель " Merial"/ «Мериал» Франция).

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Вакцина Гумбориффа (Gumborigiffa) инактивированная.
2. Вакцина Гумбориффа для профилактики болезни Гамборо птиц инактивированная изготовлена из инактивированного вируса болезни Гамборо.
3. По внешнему виду вакцина представляет собой белую однородную эмульсию, не расслаивающуюся при длительном хранении. Препарат расфасован в пластиковые флаконы по 300 мл (1000 доз). Флаконы укупорены резиновыми пробками и обкатаны алюминиевыми колпачками. Допускается иная фасовка, согласованная в установленной форме.
4. Каждый флакон снабжен этикеткой, на которой указаны на русском языке: наименование организации - изготовителя и ее товарный знак, наименование вакцины и ее объема во флаконе, количество доз, способ введения, номер серии, срок годности, условия хранения, надпись "Для животных".
5. Вакцину хранят при температуре от 2 до 8°C в сухом темном, не допуская замораживания.  
При указанных условиях хранения срок годности препарата составляет 2 года со дня изготовления. Вакцину нельзя применять после истечения срока годности.
6. Флаконы без этикеток, с нарушенной укупоркой, измененным цветом и консистенцией вакцины, содержащие посторонние примеси, а также подвергшиеся замораживанию, выбраковывают.

**II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАКЦИНЫ**

7. Вакцина Гумбориффа, вызывает выработку специфических антител против болезни Гамборо у привитой птицы.
8. Полноценный иммунитет развивается у птиц через 21 день после вакцинации.

**III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ**

9. Вакциной Гумбориффа прививают только клинически здоровую птицу.
10. Программа вакцинации включает однократную иммунизацию за 3-4 недели до начала периода яйцекладки.
11. Перед применением флаконы с вакциной выдерживают при комнатной температуре 18-20°C 8 часов или в водяной бане, тщательно встряхивают до образования однородной эмульсии.
12. Вакцину Гумбориффа вводят подкожно в область шеи или внутримышечно в область грудной мышцы или бедра в дозе 0,3 мл, соблюдая правила асептики и антисептики.
13. Остатки препарата и флаконы из-под использованной вакцины обеззараживают кипячением в течение 15 минут,

14. Убой вакцинированной птицы может производиться через 20 дней после вакцинации. Продукты убоя используют без ограничений.
13. Шприцы с натуральной резиновой прокладкой из-за возможной реакции с масляным адьювантом не применяют.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.
15. При случайном попадании препарата на кожу смыть водой с мылом
16. Хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция разработана фирмой «Мериал» Франция  
Организация-производитель фирма «Мериал»  
69800 Saint Priest, France, Laboratoire Porte Des Alpes, Rue de l'Aviation