

ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Прогрессис инактивированной
для профилактики репродуктивно-респираторного
синдрома свиней (РРСС)
(организация - производитель фирма " Мериал " /"Merial", Франция)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Вакцина Прогрессис (Progressis) инактивированная для профилактики репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС).
2. Вакцина изготовлена из инактивированного штамма Р120 не менее $2,5 \log_{10}$ IFU, масляный наполнитель и гидрогенизированный полисобутен в виде адьюванта до 2 см^3 (1 доза).
3. По внешнему виду вакцина представляет собой масляную эмульсию молочно-белого цвета. Препарат расфасовывают во флаконы по 10 и 50 см^3 , что соответствует 5 и 25 дозам. Флаконы с вакциной укупоривают резиновыми пробками укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон снабжают этикеткой, на которой указаны: наименование и адрес фирмы- изготовителя, название вакцины, номер серии, количество доз, объем вакцины, срок годности.
Флакон с вакциной упаковывают в картонную коробку. На коробке указывают: наименование фирмы-изготовителя и ее товарный знак, полное наименование вакцины, количество доз, объем вакцины, способ введения, номер серии, срок годности, условия хранения, надпись: «для животных», «стерильно»,
В каждую коробку должна быть вложена инструктаж по применению препарата.
4. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8°C в сухом темном месте, предохраняя от прямых солнечных лучей. Срок годности вакцины при соблюдении условий хранения и транспортировки – 18 месяцев. Вакцина, подвергшаяся замораживанию, а также с истекшим сроком годности к применению не пригодна.
5. Флаконы с вакциной без этикеток, с нарушением целостности укупорки, подвергшиеся замораживанию, содержащие посторонние примеси, с измененным цветом и консистенцией, а также неиспользованные при вакцинации и с истекшим сроком годности подвергаются утилизации. Утилизация проводится путем слива в специальную емкость, смешиванием с древесными опилками в соотношении 1:10 и последующем сжигании.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАКЦИНЫ

6. Вакцина Прогрессис формирует иммунный ответ против вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС).
7. Иммунитет развивается у взрослых животных в течение трех недель после ревакцинации и сохраняется в течение 6 месяцев.
8. Вакцина «Прогрессис» безопасна для свиней. Допускается местная реакция в виде кратковременного отека на месте введения (не более 3 см^3)

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ

9. Вакцина Прогрессис предназначена для активной иммунизации против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС)
10. Вакцину Прогрессис применяют из расчета, что одна прививная доза содержится в 2 см^3 вакцины. Количество доз вакцины должно соответствовать количеству прививаемых свиней. Вакцину перед применением тщательно встряхивают и применяют сразу после нарушения целостности флакона. Не использованный в процессе вакцинирования препарат утилизируют путем слива в специальную емкость, смешиванием с древесными опилками в соотношении 1:10 и последующем сжигании.

11. Вакцину Прогрессис вводят только клинически здоровым, зафиксированным свиньям строго внутримышечно в области шеи за ухом в объеме 2 см³, независимо от возраста и массы животного.
12. При проведении прививок соблюдают общие правила асептики и антисептики. Шприцы и иглы стерилизуют кипячением. Поверхность кожи на месте введения вакцины дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом. При вакцинации для каждого животного используют отдельную стерильную иглу.
13. Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтный молодняк.
14. Вакцинация свиноматок и ремонтного молодняка проводится первый раз двукратно с интервалом 21-28 суток, причем ревакцинация должна быть сделана не позднее чем за одну неделю до случки.
15. Повторная вакцинация свиноматок проводится однократно на 60-70-е сутки супоросности.
16. Убой вакцинированных животных может производиться без ограничений. Продукты убоя используют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать правила работы с инъекционными ветеринарными препаратами. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.
18. При случайной инъекции вакцины человеку необходимо немедленно обратиться к врачу.
19. Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция разработана фирмой « Мериал » Франция
Организация-производитель фирма « Мериал »
Адрес: 69007, 29 авеню Тони Гариньер, Лион, Франция
69007, 29 av. Tony Garnier, Lyon, France