

птице – подкожно в объеме 0,5 см³

Вакцину можно применять в течение 24 часов после вскрытия флакона.

3.3. При проведении вакцинации соблюдают правила асептики и антисептики. Шприцы и иглы стерилизуют кипячением. Поверхность кожи на месте введения вакцины дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом. Для каждого животного используют отдельную стерильную иглу.

3.4. Вакцинации подлежат свиньи – производители, ремонтный молодняк, свиньи, предназначенные для откорма; овцы – суягные овцематки; птицы- производители и несушки.

3.5. Вакцину « Рувакс » применяют согласно одной из схем :

- Свиньи: - ремонтный молодняк и производители:
- первичная вакцинация (ремонтный молодняк): 2 инъекции с интервалом 3-4 недели до случки
- ревакцинация : каждые 6 месяцев
- свиноматки: в конце каждого периода лактации или в течение последнего месяца супоросности
- хряки : не позднее чем за 3 недели до спаривания
- свиньи, предназначенные для откорма : 2 инъекции с 3-4-недельным интервалом, начиная с 10-недельного возраста
- Овцы: - суягные овцематки
- первичная вакцинация: 2 инъекции с интервалом 3-4 недели
- ревакцинация : 1 инъекция в последнюю треть беременности
- Птицы: - производители и несушки
- первичная вакцинация: 1 инъекция начиная с возраста 8 недель
- ревакцинация : перед началом яйцекладки.

3.6. Побочные эффекты:

- возможно образование узелка в месте инъекции вакцины
- иногда возможны аллергические реакции, у сенсibilизированных животных. В этих случаях проводят симптоматическое лечение.

3.7. Мясо убитых вакцинированных свиней используется без ограничений.

4. Порядок предъявления рекламаций

4.1. В случае несоответствия вакцины требованиям, указанным в настоящем наставлении, а также возникновении поствакцинальных осложнений, применение данной серии препарата прекращают и, в соответствии с указанием Главного управления ветеринарии МСХ РФ от 08.05.92. № 22-7/28 "О порядке предъявления рекламаций на ветпрепараты отечественного производства и закупаемые по импорту ", об этом сообщают фирме-изготовителю (Merial, 17 rue Bourgelat, 69002, Lyon, France) и Всероссийскому государственному центру качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, (123022 Москва, Звенигородское шоссе , 5 , ФГУ ВГНКИ).

Одновременно в адрес института направляют с нарочным (высылают) не менее 5 невскрытых флаконов вакцины данной серии.

Временное наставление разработано фирмой « Мериал » (Франция.)